



## Hoja de Datos del Tratamiento para Parejas y Personas con Gonorrea (Pág. 1 de 2)

- **Gonorrea** es una enfermedad transmitida sexualmente que se transmite por tener relaciones sexuales (oral, vaginal o anal) con una persona que ya la tiene. Usted pudo haber sido expuesto, pero es fácil de curar.
- Gonorrea se cura fácilmente con la medicina cefixime conocida también como Suprax®.
- Su compañero(a) tal vez le dio cefixime (una pastilla) o una prescripción por cefixime. Esta medicina se la dieron a su compañero(a) por su doctor para tratarlo a usted. Si su compañero(a) le dio una prescripción, usted puede ir a la farmacia para obtenerla.

### **Síntomas de Gonorrea:**

La mayoría de las personas infectadas con gonorrea **NO** tienen síntomas. Si usted tiene síntomas podrían ser los siguientes:

- Hombres tienen dolor al orinar, una secreción blanca, amarilla o verde del pene, o dolor en los testículos.
- Mujeres tienen dolor al orinar, aumento de secreción vaginal, sangre vaginal entre una regala y otra, o dolor al tener relaciones sexuales.
- Cuando hay una infección en el ano tanto hombres como mujeres pueden tener secreciones, comezón dolor, sangre, o dolor al ir al baño.
- Recuerde, usted no tiene que tener estos síntomas para tener gonorrea. Muchas personas pueden tener y contagiar esta infección sin haber tenido ningún síntoma.

**NO TOME** la medicina sin primero ver a su doctor, si usted:

- Es mujer y tiene dolor en la parte baja del abdomen, dolor durante las relaciones sexuales, vómito, o fiebre.
- Es hombre y tiene fiebre, dolor o inflamación en los testículos.
- Tiene dolor e inflamación en las articulaciones (coyunturas).
- Tiene ronchas (sarpullido) por todo el cuerpo.
- Ha tenido alguna mala reacción, ronchas, problemas para respirar, o reacción alérgica después de tomar cefixime o otro antibiótico. Por **favor consulte con su médico antes de tomar cefixime o si tiene alergias a los antibióticos.**
- Tiene una enfermedad crónica seria como: problemas en el riñón, corazón o del hígado.
- Esta tomando actualmente otro medicamento, incluyendo medicina para la diabetes. Esta bien tomar este medicamento con medicina sin prescripción para el dolor, o resfriado y vitaminas

**Si algo de esto es verdad, o tiene alguna pregunta, No tome cefixime y hable con su doctor lo más pronto posible, para que pueda obtener el mejor tratamiento.**

### **Como tomar la medicina:**

- Usted debe tener (1) pastilla de cefixime, 400 mg. Usted debe tomar la pastilla con agua para tratar la infección.
- Tome esta pastilla con alimento; esto reducirá la posibilidad de tener malestar estomacal.
- **NO** tome antiácidos (como Tums, Roloids, o Maalox) por una (1) hora antes o dos (2) horas después de tomar la pastilla de cefixime.
- No comparta o regale la medicina cefixime con ninguna persona.

*Esta información fue desarrollada y aprobada por el departamento de Servicios de Salud de Arizona, Programa de Enfermedades Transmitidas Sexualmente (Octubre 2008).*

## **Hoja de Datos del Tratamiento para Parejas y Personas con Gonorrea (Pág. 2 de 2)**

### **Reacciones alérgicas\*:**

- Dificultad para respirar y/o presión en el pecho
- Cierre de la garganta
- Inflamación de los labios o lengua
- Ronchas (irritación de la piel que da comezón)

### **Efectos secundarios:**

Efectos secundarios generalmente no son serios, pero pueden ser:

- Ligero malestar estomacal
- Diarrea
- Mareo
- Hongos en la vagina

**\*;Si usted sufre de alguna de estas reacciones alérgicas por favor llame al 911 o vaya a emergencia inmediatamente!**

### **Cosas muy importantes que recordar:**

- La mejor manera de tratar la infección es ver a su propio médico o ir a su clínica. Si usted no puede ir al doctor en los siguientes días, deberá tomar cefixime.
- Si usted decide no tomar la medicina para tratar la gonorrea usted podría enfermarse seriamente. Mujeres posiblemente no puedan tener hijos. Si esta embarazada actualmente, es seguro tomar cefixime, pero asegúrese de ver a su doctor para un chequeo general
- Si usted decide no tomar la medicina deberá buscar asistencia médica lo mas pronto posible.
- Es muy importante ver a un doctor lo mas pronto para hacerse exámenes para otras enfermedades transmitidas sexualmente. Cefixime no curará otras infecciones.
- No debe tener relaciones sexuales por los siguientes (7) días después de haber tomado la medicina. Si usted tiene relaciones sexuales sin condón, o con condón y el condón se rompe, durante esos siete días usted podría transmitir la infección y posiblemente volver a infectarse
- Si usted tiene otros compañeros(as) sexuales, dígales que esta siendo tratado(a) por gonorrea, para que puedan hacerse una prueba también.
- Si una persona ha sido infectada con gonorrea una vez es muy seguro que se contagien otra vez. Es buena idea hacerse la prueba para la gonorrea y otras enfermedades transmitidas sexualmente de aquí a tres (3) meses, para asegurarse de no tiene otra infección.
- Los antibióticos pueden hacer que las pastillas anticonceptivas sean menos efectivas en prevenir un embarazo. Otro método alternativo para la prevención de un embarazo como el condón deberá ser utilizado por dos semanas después de tomar el medicamento, cefixime.

Si usted tiene preguntas acerca de la medicina, gonorrea, o otra enfermedad transmitida sexualmente o exámenes para enfermedades de transmisión sexual, por favor comuníquese con su medico o llame al Departamento de Servicios de Salud de Arizona: 602-364-4666.

*Local provider contact information here*